

**AIRONE CENERINO** (*Ardea cinerea*)

L'airone più grosso e più frequente. Quando le acque ghiacciano e non può più pescare, si sposta sui prati a caccia di arvicole e topolini. Nidificante stanziale, migratore, svernante parziale.



**NITTICORA** (*Nycticorax nycticorax*)

Airone dalle abitudini piuttosto riservate. Solitamente nidifica in colonie; in oasi si riproduce invece in coppie isolate. Nidificante, migratore.



**PETTAZZURRO** (*Luscinia svecica*)

Passeriforme migratore, si avvista più frequentemente in aprile e in agosto-settembre. Migratore.



**TARABUSINO** (*Ixobrychus minutus*)

L'airone più piccolo, ricorda un tarabuso in miniatura e da qui deriva il suo nome. Il canto territoriale del maschio ricorda il gracidiare di una rana e il grugnito di un maialino allo stesso tempo. Nidificante, migratore.



**MARTIN PESCATORE** (*Alcedo atthis*)

Coloratissimo, si nutre di piccoli pesci che cattura con tuffi spettacolari. Nidifica in scarpate di sabbia. Migratore, estivante, svernante irregolare.



# LAGO GRANDE

## L'AVIFAUNA DELL'OASI

Gli uccelli costituiscono la principale attrattiva dell'oasi: all'interno dell'area, fino a tutto il 2007, sono state osservate 214 specie, di cui 69 nidificanti. Tra queste ultime, svasso maggiore, tuffetto, tarabusino, nitticora, airone rosso, airone cenerino, falco pecchiaiolo, nibbio bruno, poiana, sparviere, gheppio, lodolaio, porciglione, civetta, alocco, tre specie di picchi, gruccione, saltimpalo, forapaglie, cannareccione, cannaiola, cannaiola verdognola, picchio muratore, rampichino, averla piccola. Durante le migrazioni si possono incontrare moltissime specie. I periodi migliori per l'osservazione sono aprile-maggio e settembre-ottobre e, con un po' di fortuna, si possono osservare vere e proprie rarità, come albanella pallida, poiana codabianca, poiana calzata, cesena di Naumann, canapino pallido, lui forestiero, zigolo di Lapponia, zigolo golarossa, oltre a moretta tabaccata, aquila minore e re di quaglie. Frequenti albanella minore, falco di palude, astore, falco cuculo, pellegrino e barbagianni, meno comuni biancone, gufo comune e gufo di palude. Nel pannello sono illustrate alcune specie rappresentative: per ciascuna di esse è specificato l'ambiente in cui è più probabile avvistarle..

Acqua libera



Canneto



Boscaglia di contorno (saliceto, ontaneta, altro)



**GERMANO REALE** (*Anas platyrhynchos*)

L'anatraselvatica più comune, è la progenitrice delle anatre domestiche. Nidificante stanziale, migratore.



**SVASSO MAGGIORE** (*Podiceps cristatus*)

Costruisce un nido galleggiante, ancorato alla vegetazione acquatica. Presente con una coppia. Nidificante, migratore e svernante irregolare.



**PENDOLINO** (*Remiz pendulinus*)

Piccolo passeriforme che costruisce un complicato nido che "pende" dai rami su cui è posto. Migratore regolare, svernante, più raro in estate.



**FOLAGA** (*Fulica atra*)

Caratteristico abitante delle zone umide, si riconosce facilmente per la combinazione di colore nero e placca frontale e becco bianchi. Migratore, nidificante, svernante.

**MORIGLIONE** (*Aythya ferina*)  
**MORETTA** (*Aythya fuligula*)

Anatre tuffatrici (si immergono completamente per cercare cibo, a differenza delle anatre di superficie, come il germano), frequentano l'oasi soprattutto durante la migrazione.



**FISTIONE TURCO** (*Netta rufina*)

Anatra variopinta presente irregolarmente durante le migrazioni. Come nella maggior parte delle anatre, i colori sgargianti sono prerogativa esclusiva del maschio.